

INFORMACION GENERAL

- Bipsias de próstata previas
SI___NO___
- Cuál es la indicación de la bipsia?
Tacto rectal Anormal___ PSA
elevado___ Re-bipsia___
- Cuál es el nivel del antígeno prostático
específico? ___
- Tiene algún tipo de patología cardiaca,
como reemplazo valvular o enfermedad
valvular? SI___ NO___
- Toma Aspirina o anticoagulantes de
forma permanente (Warfarina,
Cumadina: SI___ NO___:
(por favor suspender estos
medicamentos 10 días antes del
procedimiento).
- Ha tenido infecciones de la orina o la
próstata recientemente?
SI___ NO___
- Ha tenido reemplazo de alguna
articulación en los últimos 6 meses
SI___ NO___
- Ha recibido antibiótico para el
tratamiento de alguna patología
prostática y/o urinaria reciente?
SI___ NO___

QUE ES LA BIOPSIA DE PROSTATA:

La bipsia de Prostata es un examen diagnóstico que consiste en extraer muestras de la próstata, con el objetivo de identificar anomalías como inflamación, agrandamiento y cáncer.




Figura 1. Ecografía y Biopsia de Próstata.

COMO SE REALIZA?

El procedimiento consiste en los siguientes pasos:

El Médico le administrará anestésico en forma de Gel a través del recto para disminuir la incomodidad.

Se le realizará el tacto Rectal para evaluar el tamaño de la próstata y la identificación de la presencia de nódulos o masas y una ecografía transrectal de la próstata a través de la inserción de un transductor (Figura 1), la cual evalúa el volumen y la presencia de lesiones focales o masas.

Posteriormente el Médico le administrará una solución anestésica inyectada en los tejidos blandos de la próstata y a su alrededor para disminuir el dolor y la molestia durante la toma de las muestras para bipsia.

La visión ecográfica constante permite guiar la aguja de bipsia para obtener tejido de diferentes porciones de la próstata. Igualmente permite identificar y esquivar vasos sanguíneos, la uretra y la vejiga.

Usualmente se obtienen mínimo 12 (doce) muestras de la próstata, con el objeto de tener las muestras más representativas, y evitar que ocurran casos de falsos negativos.

En casos de rebiopsia (Repetir el procedimiento), se aumenta el número de bipsias a un total de 14 a 18 muestras).

El procedimiento demora alrededor de 20 minutos, después de los cuales el paciente debe pasar a sala de observación en las Clínicas Urológicas durante 1 hora, para asegurar que no se presenten complicaciones inmediatas.

QUE DEBE TRAER PARA ESTE PROCEDIMIENTO

Debe traer el resultado de un parcial de orina no mayor de 15 (quince) días (no traer la muestra de orina).

Debe traer el reporte de un cultivo rectal, el cual identificará los gérmenes que habitan en el recto que pueden aumentar el riesgo de una posible infección; con el fin de administrarle el antibiótico profiláctico adecuado. (Esta muestra se tomara en las clínicas Urológicas mínimo una semana previa al procedimiento).

El Médico Radiólogo o Urólogo discutirá con usted el procedimiento, y usted debe firmar un consentimiento informado autorizando su realización.

COMO DEBE PREPARARSE PARA EL PROCEDIMIENTO?

Asista con un acompañante a las Clínicas Urológicas de la Fundación Santa Fe de Bogota, una hora antes del procedimiento.

Este examen NO requiere ayuno; es importante no tener horas prolongadas sin comer, esto evitara bajas de azúcar que le pueden provocar sensación de mareo durante y posterior al procedimiento.

El día del examen 2 horas antes del procedimiento usted debe administrarse 2 enemas tratvat de 133cc para administración en el recto.

El antibiótico profiláctico le será administrado en las clínicas Urológicas 1 hora antes del procedimiento, de acuerdo al reporte del cultivo rectal. (Este puede ser de administración oral o intravenosa).

RECOMENDACIONES POSTERIORES A LA REALIZACION DE BIOPSIA DE PROSTATA

Se le realizará seguimiento telefónico la semana siguiente a su procedimiento para vigilar la aparición de posibles complicaciones.

El día del procedimiento, siga las siguientes recomendaciones:

- No ingerir bebidas alcohólicas, no tomar sedantes ni tranquilizantes.
- Es recomendable no conducir vehículos, no operar maquinaria, ni realizar actividades físicas de alto esfuerzo/impacto. Al siguiente día puede tener actividad física normal.
- Puede comer normalmente después de la biopsia.
- No tome aspirina, Warfarina (Cumadina) o cualquier otro anticoagulante los tres primeros días después de la biopsia. (Consulte con su médico el momento de iniciarlos, si usted consume regularmente estos medicamentos).
- Es normal tener escasa cantidad de sangre en la orina, en las deposiciones (materia fecal) o en las primeras eyaculaciones (esperma). Este sangrado escaso puede durar 2 ó 3 semanas, incluso hasta 1 mes en algunas ocasiones.

SIGNOS Y SINTOMAS DE ALERTA POR LOS CUALES CONSULTAR

Los signos de alarma que deben motivar asistencia al servicio de urgencias cercano o comunicación con su Urologo Tratante:

Fiebre, escalofrío, malestar general, dolor de difícil manejo y dificultad para orinar, no espere a sentirse muy enfermo para consultar.

Pida cita con su médico tratante para revisar y discutir los resultados de la biopsia.

Nos pondremos en contacto con usted para entregar el reporte del resultado de patología, con la descripción del procedimiento y la impresión radiológica, para retirarlas antes de presentarse al control con su médico tratante, alrededor de 5 días hábiles.



**Clínica de Próstata
Clínicas Urológicas
Departamento de urología
Hospital Universitario Fundación Santafé**

**6030303 ext. 5512 – 5513
Clinicas.urológicas@fsfb.org.co**



**CLINICA DE PROSTATA
CLINICAS UROLOGICAS
DEPARTAMENTO DE IMÁGENES
DIAGNOSTICAS**

Nombre: _____

Identificación: _____

Su cita es el día: _____

Hora del Procedimiento: _____

Hora de Llegada: _____

Realizado Por: _____

Remitido por: _____