


Vasectomía

Dr. Mauricio Plata | UROLOGÍA



Vasectomía

- 1 La Vasectomía es un procedimiento médico de consultorio para el control de la natalidad que corta los conductos que transportan los espermatozoides al semen.
- 2 Es un procedimiento ambulatorio que se puede realizar bajo anestesia local o con sedación.
- 3 Las tasas de éxito de la vasectomía son cercanas al 99.9%. De todos los procedimientos de planificación, la vasectomía es la que tiene las tasas más altas de efectividad.

Dr. Mauricio Plata | UROLOGÍA

Vasectomía

- 4 Comparativamente con la ligadura de trompas en la mujer, las tasas de éxito son similares. Sin embargo la ligadura de trompas en la mujer implica un procedimiento invasivo con anestesia general y mayor riesgo de complicaciones.
- 5 Una vez tomada la decisión de vasectomía, se programa el procedimiento. Si se escoge la modalidad de hacerlo con anestesia local no hay necesidad de tener ayuno.

Dr. Mauricio Plata | UROLOGÍA

Vasectomía

- 6 Se debe llegar 30 minutos antes de la hora programada del procedimiento, para realizar el trámite administrativo en Clínicas Urológicas de la FUNDACIÓN SANTA FE:
Teléfono +57 60(1) 603 0303 ext. 5512 / 5513
Se debe venir acompañado.
- 7 El procedimiento se hace a través de la piel del escroto donde por una pequeña incisión de menos de un centímetro, se localizan los conductos deferentes los cuales se cortan y ligan previa colocación de un agente anestésico local.

Dr. Mauricio Plata | UROLOGÍA

Vasectomía

- 8 Posterior a esto, la persona debe guardar reposo en casa por 24 horas pudiendo reiniciar sus actividades laborales de oficina al día siguiente. Las actividades deportivas y vida sexual deben posponerse por 8 días después de la vasectomía.
- 9 En el caso de querer practicar el procedimiento bajo sedación, se debe programar el procedimiento los días **miércoles** en la tarde en clínicas urológicas.

Dr. Mauricio Plata | UROLOGÍA

Vasectomía

- 10 La sedación implica posterior al procedimiento una recuperación de aproximadamente 45 minutos en la clínica y luego la persona puede ir a casa con las mismas recomendaciones anteriores.
- 11 Es normal después de la vasectomía sentir una leve inflamación en el escroto así como la aparición de un pequeño morado (equimosis) en el sitio donde se realiza el procedimiento.

Dr. Mauricio Plata | UROLOGÍA

Vasectomía

- 12 Es recomendable usar hielo de manera intermitente por 3 días y utilizar doble calzoncillo para mantener soportado el escroto y evitar la inflamación.
- 13 Es muy importante estar seguro que no se quiere tener mas hijos ni ahora ni a futuro ya que la vasectomía si bien es reversible, es un procedimiento de carácter definitivo ya que la reversión no asegura fertilidad futura y genera costos y procedimientos mayores para la persona.

Dr. Mauricio Plata | UROLOGÍA